

Séries de Fourier : synthèse de cours

But : Ecrire une fonction f continue par morceaux et 2π -périodique sous la forme :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) = \frac{a_0}{2} + \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

ou sous la forme :

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}.$$

1 Coefficients de Fourier et Séries de Fourier

Définition 1 :

Coefficients réels de f : $a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt, n \geq 0, b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt, n > 0$

Coefficients complexes de f : $c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt.$

Remarques :

Comme les fonctions sont 2π -périodiques, on peut calculer les intégrales sur n'importe quel intervalle de longueur 2π .

On écrit souvent a_n et b_n au lieu de $a_n(f)$ et $b_n(f)$ s'il n'y a pas de confusion entre plusieurs fonctions.

On utilise plutôt a_n et b_n si f est à valeurs réelles, et c_n pour f à valeurs complexes.

Remarque utile pour les calculs :

f paire $\Rightarrow b_n = 0, \forall n > 0$ et $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \cos(nt) dt, n \geq 0.$

f impaire $\Rightarrow a_n = 0, \forall n > 0$ et $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin(nt) dt, n \geq 0.$

Définition 2 :

La série $\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$ ou $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}$ s'appelle série de Fourier associée à f .

Remarques :

1. La somme partielle de cette série est un polynôme trigonométrique et vaut :

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) \text{ ou } S_N(x) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}.$$


$S_N(x) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx} = \sum_{n=-N}^N \langle f, e^{inx} \rangle e^{inx}$ est le projeté orthogonal de f sur le sous-espace vectoriel engendré par les $(e^{inx})_{n=-N}^N$.

2. Si on définit le produit scalaire : $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$, alors on a :

$$\langle f, 1 \rangle = \frac{a_0}{2}, \quad \langle f, \cos(nx) \rangle = \frac{a_n}{2}, \quad \langle f, \sin(nx) \rangle = \frac{b_n}{2}, \quad \langle f, e^{inx} \rangle = c_n.$$

QUESTIONS :

- Pour quelles fonctions f y a-t-il convergence ?
- Y a-t-il convergence vers f ?
- De quelle type de convergence s'agit-il ? Cv pour la norme quadratique $\|\cdot\|$? Cv simple et dans ce cas pour quels x a-t-on la convergence ? Cv normale ?



2 Convergence des séries de Fourier

2.1 Convergence en norme quadratique

Théorème de Parseval : f continue par morceaux, 2π -périodique \Rightarrow les sommes partielles S_N cv vers f en norme quadratique cad : $\lim_{N \rightarrow +\infty} \|f - S_N\|^2 = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t) - S_N(t)|^2 dt = 0$, et on a la formule de Parseval :

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 = \|f\|^2 = \frac{|a_0|^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} (|a_n|^2 + |b_n|^2).$$

2.2 Convergence simple

Théorème de Dirichlet : $f \in \mathcal{C}^1$ par morceaux, 2π -périodique (non nécessairement continue) \Rightarrow

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) = \begin{cases} f(x) & \text{si } f \text{ est continue en } x \\ \frac{1}{2}(f(x^+) + f(x^-)) & \text{si } f \text{ est discontinue en } x \end{cases}$$

Remarque : On peut calculer des séries en prenant des valeurs particulières de x .

2.3 Convergence normale

f continue, \mathcal{C}^1 par morceaux et 2π -périodique \Rightarrow la série de fonctions cv normalement vers f . (voir exo TD)

2.4 Non convergence

Si f est seulement continue (ou seulement continue par morceaux), on ne peut rien dire sur la convergence de S_N quand N tend vers $+\infty$, elle peut diverger.

Remarque : f est continue par morceaux si sur tout segment elle est continue sauf en un nombre fini de points de discontinuité x_0 où elle admet une discontinuité de 1ère espèce cad $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f$ existent mais différent de $f(x_0)$.

3 Que faire en général dans les exercices ?

1. Tracer le graphe de f sur plusieurs périodes
2. Déterminer la classe (= régularité) de f pour connaître la convergence de la série de Fourier
3. Calculer les coefficients de Fourier de f (a_n, b_n, c_n selon le contexte)
4. Appliquer Parseval et/ou Dirichlet selon la classe de f

4 Que faire si on ne comprend rien ?

Apprendre le cours, refaire les exercices du TD et poser des questions :-)